

Carbatène

Synonyme :


Famille : Dithiocarbamates

Groupe : Fongicides

Inscription sur la liste positive européenne :

INSCRIITE	NON INSCRIITE	REVISION	
			non listée

Utilisations :



PRÉSENCE dans les éditions de l'index
(1^{re} édition en 1961)

HOMOLOGATION avant les éditions de l'index

Usages :

PARTIES AERIENNES

Grandes cultures	1 ^{ère} édition	Dernière édition	Cultures particulières	Utilisation seule	Utilisation en associations	Remarques
Betterave						
Céréales						
Maïs						
Oléagineux						
Pomme de terre	1961	1984			X	Manèbe Cuivre
Protéagineux						
Arbres fruitiers						
A pépins	1962	1992	Pommier, poirier	X	X	Manèbe Carbaryl Parathion éthyl
A noyaux	1968	1976	Prunier, pêcher	X	X	Manèbe Carbaryl Parathion éthyl
Petits fruits						
Agrumes						
Autres						
Cultures forestières	1962	1979			X	***
Cultures légumières	1962	1979			X	***
Cultures ornementales						
Cultures tropicales						
Viticulture	1961	1992		X	X	***
Cultures diverses						
Traitements généraux						

AUTRES

Traitement de semences	1962	1981	Céréales	X	X	HCB Lindane Anthraquinone
Traitement de sols						
Denrées entreposées						
Locaux de stockage						
Bâtiments d'élevage						

Caractéristiques (1992) :

- action : préventive de contact
- solubilité dans l'eau : -
- spectre : -
- persistance d'action : -

Toxicité (1992) :

	Physicochimie	Toxicité				Écotoxicité		
		Inflammabilité	Aiguë	Chronique	Irritant	Sensibilisant	N	Phrases R
Molécule		DL50 rat par ingestion : 2000 mg/kg						Dangereux pour le gibier
Spécialités								

1^{ère} spécialité commerciale : Organil (1959)

Évolution de formulation : -